



Lënda vepruese: Propiconazole
PËRMBAJTJA: Propiconazole: 25%
Lëndë ndihmëse: 75%
Numri i regjistrimit: AL: 37/2-08.10.2010
KS: 089-0733-11-2007/05.03.2007
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm

FUNGICID SISTEMIK ME SPEKTËR TË GJERË VEPRIMI E PËRDORIMI. KA EFEKT PARAMBROJTËS, SHËRUES DHE ÇRRËNJOSËS

PËRDORIMI:

KULTURAT BUJQËSORE	SËMUNDJET	Doza
Hardhi	Hiri (<i>Uncinula necator</i>)	10–15 ml /100 litra ujë.
TË LASHTAT (Grurë, Elb, Tërshërë, Thekër)	Hiri (<i>Erysiphe graminis</i>), Ndryshqet (<i>Puccinia sp.</i>), Septoriozat (<i>Septoria sp.</i>), <i>Ascochyta tritici</i> , <i>Pyrenophora spp.</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Cochliobolus sativus</i> , <i>Rhynchosporium secalis</i> & <i>Helminthosporioza</i> (<i>Helminthosporium teres</i>). Kontrollon pjesërisht Fuzariozat (<i>Fusarium spp.</i>) dhe <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	0,5 litra / ha
Misër	Helminthosporiozat (<i>Helminthosporium spp.</i>) & Ndryshqet (<i>Puccinia sp.</i>)	0,5 litra / ha
Oriz	Helminthosporioza (<i>Helminthosporium oryzae</i>) & Cercospora (<i>Cercospora oryzae</i>) <i>Entyloma oryzae</i> & <i>Rhizoctonia solani</i> & <i>Rhynchosporium oryzae</i> <i>Acrocyllindrum oryzae</i> . Kontrollon pjesërisht: <i>Piricularia oryzae</i> (<i>Pyricularia oryzae</i>)	0,75 litra / ha.
Kikirik	<i>Cercospora arachidicola</i> & <i>Cercosporidium persanatum</i> Kontrollon pjesërisht: <i>Puccinia arachidis</i> , <i>Ascochyta spp</i> <i>Sphaceloma arachidis</i> , <i>Phoma arachidicola</i>	0,5 - 0,7 litra / ha
Panxhar sheqeri	Hiri (<i>Erysiphe communis</i>) & Ndryshku (<i>Uromyces betae</i>) Kontrollon pjesërisht: Pikalorja e panxharit (<i>Cercospora beticola</i>)	0,3 – 0,5 litra / ha.

MËNYRA DHE KOHA E TRAJTIMIT:

Me spërkatje. Trajtimet fillojnë kur shfaqen shënjat e para të sëmundjeve dhe përsëriten pas 3- 4 javësh në të lashtat e panxhar sheqeri dhe pas 2 javësh në kulturat e tjera.

FITOTOKSICITETI: Tilt nuk është fitotoksik kur përdoret sipas rekomandimeve të mësipërme.

PËRZIHET me shumicën e insekticideve, fungicideve, herbicideve, rregullatorëve të rritjes dhe mikroelementeve, që përdoren në këto kultura.

SPËRKATJA E FUNDIT PARA VJELJES: Të lashta dhe misër 30 ditë, Oriz 36 ditë, Kikirik, Hardhi dhe Panxhar sheqeri 14 ditë.

PERIUDHA E RUAJTJES: 3 vjet. Preparati ruhet në shishe të mbyllura, në vende të thata e të ajrosura. Evitoni ruajtjen në temperatura nën -10° C mbi 35° C.

MASAT PARAMBROJTËSE

-Evitoni kontaktin me sytë dhe lëkurën. –Mbroni rrugët e frymëmarrjes duke përdorur mjetet mbrojtëse. -Mos hani dhe mos pini lëngje e duhan gjatë përdorimit. -Gjatë punës përdorni mjetet mbrojtëse. -Pas pune duart dhe fytyra duhet të lahen dhe rrobat të ndërrohen. -Lani pajisjet mbrojtëse para se ti ripërdorni.

UDHËZIME PËR NDIHMËN E PARË DHE KËSHILLA PËR MJEKUN:

Në rast kontakti me lëkurën hiqni menjëherë rrobat e ndotura, lani lëkurën me ujë të bollshëm e sapun. Lani rrobat e ndotura para se ti rivishni. -Në rast kontakti të preparatit me sytë i lani ato me ujë të bollshëm për 10-15 minuta dhe kërkoni këshillë mjekësore. -Në rast se merret me organet e frymëmarrjes nxireni të aksidentuarin në vende të ajrosura. –Në rast gëlltitje jepini në mënyrë të përsëritur karbon aktiv dhe ujë të bollshëm. Çojeni të aksidentuarin në spital dhe i tregoni mjekut etiketën e produktit. Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.
Tel. Urgjence: +44 1484 538 444.



**RELATIVISHT JO HELMUES PËR BLETËT
HELMUES PËR PESHQIT, ALGAT DHE
ORGANIZMAT UJORE.**
**Mos ndotni ujrat me preparatin ose me
ambalazhin e tij.**

TË RUHET NË VENDE TË SIGURTA DHE LARG FËMIJËVE.

PRODHUESI: SYNGENTA Crop Protection AG,
Basel, Switzerland
Tel: +41 61 323 11 11 ; Fax: +41 61 323 12 12